

MDMA/ ecstasy

- većina «E» tableta sadrži MDMA
- neke tablete «E» ne sadrže MDMA, ili sadrže razne supstance.

Sjedinjene Američke Države:

- 1999 godine: **2848** posjeta hitnoj pomoći, 78% od toga u kombinaciji sa drugim sredstvima, najviše alkohol
- **2,9 do 3,6 na 10 000 korištenja** završi na hitnoj službi

Australija:

- **11 na 10 000 korištenja** završi na hitnoj službi

Engleska:

- 0,21 SMRTI na 10 000 korištenja (1995-96)

Škotska:

- 0,87 SMRTI na 10 000 korištenja (1995-97)
-

Komplikacije:

- hipertermija
- psihijatrijske komplikacije
- hepatotoksičnost
- hiponatriemija

Opisuju se i cerebrovaskularne, kardiovaskularne, neurološke, hematološke, respiratorne, očne, dermatološke teratogene i stomatološke smetnje.

Manjina korisnika može se klasificirati kao ovisni o ecstasy, kada se koriste standardni kriteriji za ovisnost

Češća upotreba odnosno ukupna konzumirana doza rizičan je faktor za psihičke smetnje.

Jake neželjene doze, čak i smrt, mogu nastupiti nakon umjerenih doza ecstasy, u odsutnosti poznatih rizičnih čimbenika